par

J.C. Auclair, M. Bisson et M. Lachance

Etude des variations de l'alcalinité des lacs de tête de la région de Québec

INRS-Eau Université du Québec C.P. 7500 Sainte-Foy (Québec) G1V 4C7

TABLE DES MATIERES

		PAGE
TABLE	DES MATIERES	i
LISTE	DES FIGURES	iv
LISTE	S DES TABLEAUX	vii
Objec	tifs	1
MATER	IEL ET METHODES	2
I -	Alcalinité Gran	2
	Campagne du 23.09.80	4
	Campagne du 19.11.80	4
	Campagne du 24.02.81	5
I I -	Anions	5
	Chlorures	5
	Sulfates	5
III-	Cations	6
	Aluminium	6
TV-	Couleur et absorbance à 540 mm	6

	PAGE
RESULTATS	. 7
Commentaires généraux	7
Disposition des résultats	7
Graphiques de l'alcalinité vs [Ca ²⁺ + Mg ²⁺]	8
Graphiques des sulfates vs [Ca ²⁺ + Mg ²⁺ - Alc]	12
INTERPRETATION DES ANALYSES EN COMPOSANTES PRINCIPALES	17
Matrices des corrélations entre variables	17
Première envolée	17
Deuxième envolée	17
Troisième envolée	17
Matrices des corrélations entre différences des variables	24
Première et deuxième envolées	24
Première et troisième envolées	24
Deuxième et troisième envolées	24
ALUMINIUM TOTAL ET ALUMINIUM FILTRE	32
CONCLUSIONS	35
RECOMMANDATIONS	36

	P	PAGE
APPENDICE	E I - LA CONDITION D'ELECTRONEUTRALITE DANS LES EAUX DU BOUCLIER CANADIEN	37
APPENDICE	E II - RELATIONS ENTRE pH, LE CARBONE INORGANIQUE TOTAL ET L'ALCALINITE CALCULEE	40
APPENDICE	III - RELATIONS MORPHO-EDAPHIQUES	43
APPENDICE	IV - TABLEAUX DES RESULTATS DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES	46
LISTE DES	S REF ERENCES	50

LISTE DES FIGURES

		PAGE
Figure 1	Localisation des lacs échantillonnés et parcours hélicoptère	3
Figure 2	Graphique de l'alcalinité (μ éq.L-1) versus [Ca ²⁺ + Mg ²⁺] (μ éq.L-1). Distribution des lacs échantillonnés le 23.09.80.	9
Figure 3	Graphique de l'alcalinité (μ éq.L-1) versus [Ca ²⁺ + Mg ²⁺] (μ éq.L-1). Distribution des lacs échantillonnés le 19.11.80.	10
Figure 4	Graphique de l'alcalinité (μ éq.L ⁻¹) versus [Ca ²⁺ + Mg ²⁺] (μ éq.L ⁻¹). Distribution des lacs échantillonnés le 24.02.81.	11
Figure 5	Graphique des sulfates (μ éq.L ⁻¹) versus [Ca ²⁺ + Mg ²⁺] (μ éq.L ⁻¹). Distribution des lacs échantillonnés le 23.09.80.	13
Figure 6	Graphique des sulfates (μ éq.L-1) versus [Ca ²⁺ + Mg ²⁺] (μ éq.L-1). Distribution des lacs échantillonnés le 19.11.80.	14
Figure 7	Graphique des sulfates (μ éq.L ⁻¹) versus [Ca ²⁺ + Mg ²⁺] (μ éq.L ⁻¹). Distribution des lacs échantillonnés le 24.02.81.	15

Figure	8	Projection des deux premiers axes composantes principales effectuée tableau 1.		
		Symbolisme: chiffres = numéro du tableau 1	lac; lettres = voir	19
Figure	9	Projection des deux premiers axes composantes principales effectuée tableau 2.	•	
		Symbolisme: voir figure 8		21
Figure	10	Projection des deux premiers axes composantes principales effectuée tableau 3. Symbolisme: voir figure 8	· ·	23
Figure	11	Projection des deux premiers axes composantes principales effectuée tableau 4. Symbolisme: voir figure 8	•	26
Figure	12	Projection des deux premiers axes composantes principales effectuée tableau 5.		
		Symbolisme: voir figure 8		28

Figure 13	Projection des deux premiers axes de l'analyse en composantes principales effectuée sur la matrice du tableau 6. Symbolisme: voir figure 8	30
Figure 14	Graphique de l'aluminium soluble - $[Al^{3+}]$ + $[Al(OH)_X]$ (µg.L ⁻¹) versus absorbance à 540 mm. Chiffres = distribution des lacs.	34
Figure C1	Relation entre l'alcalinité au point total d'inflection (μ éq.L-1) versus surface du bassin versant (km²)	44
Figure C2	Relation entre la superficie du bassin et la superficie des lacs échantillonnés	45

LISTE DES TABLEAUX

			PAG E
Tableau	1	Coefficients de corrélation - Campagne du 23.09.80	18
Tableau	2	Coefficients de corrélation - Campagne du 19.11.80	20
Tableau	3	Coefficients de corrélation - Campagne du 24.02.81	22
Tabl eau	4	Coefficients de corrélation - Campagnes 1 - 2	25
Tableau	5	Coefficients de corrélation - Campagnes 1 - 3	27
Tableau	6	Coefficients de corrélation - Campagnes 2 - 3	29
Tabl eau	7	Calcul des hydroxo-complexes d'aluminium	33
Tableau	A1	Déficits anioniques	39
Tableau	A2	Comparaison des alcalinités calculées et de Gran	41
Tableau	А3	Résultats de la campagne du 23.09.80	47
Tableau	A4	Résultats de la campagne du 19.11.80	4 8
Tableau	A5	Résultats de la campagne du 24.02.81	49

ETUDE DES VARIATIONS DE L'ALCALINITE DES LACS DE TETE DE LA REGION DE QUEBEC

Objectifs:

- 1- Echantillonner une série de lacs de tête possédant les caractéristiques suivantes:
 - A- Les lacs devront être éloignés des routes et posséder des aires de bassin versant variables.
 - B- L'axe longitudinal doit être orienté parallèle au trajet de retrait du glacier lors de la fin de la glaciation du Pleistocène.
- 2- Evaluer la variabilité physico-chimique des cuvettes lacustres en période de très faible écoulement des eaux de ruissellement du bassin versant.
- 3- Déterminer les alcalinités au point total d'équivalence, de manière à obtenir une mesure juste de la résistance à la protonation des cuvettes lacustres.

MATERIEL ET METHODES

Les lacs ont été choisis à partir de cartes topographiques du ministère canadien de l'Energie, des Mines et des Ressources (1:50 000). Tout en se restreignant à une petite aire géographique, nous avons sélectionné des lacs de tête manifestant un axe longitudinal nord-sud, et des pentes de bassins versants aiguës. Ce dernier critère a été retenu parce que nous cherchions de préférence des bassins versants à très faible capacité d'échange cationique (CEC) et en absence de données sur l'épaisseur de sédiments meubles, nous avons comme première approximation supposer que la CEC était reliée au temps de résidence des eaux de ruissellement du bassin versant. Lors de la troisième campagne d'échantillonnage, nous avons échangé un certain nombre de lacs pour en échantillonner d'autres à une latitude supérieure. Les lacs sont localisés sur la figure 1.

Les campagnes d'échantillonnage ont été effectuées par hélicoptère. Un échantillon (1L) d'eau intégré fut obtenu soit à l'aide d'un tube intégrateur (campagne du 23.09.80) ou d'une bouteille de mariotte qui était descendue et remontée à vitesse constante. Les échantillons d'eau ont été acheminés au laboratoire dans des glacières, dans un délai qui n'a jamais excédé six heures.

Les mesures physico-chimiques ont été effectuées à l'intérieur des délais prescrits par l'Environmental Protection Agency (EPA) des Etats-Unis. Ainsi, le pH et la conductivité ont été mesurés le jour de l'échantillonnage alors que le carbone inorganique total et l'alcalinité ont été déterminés le lendemain de l'échantillonnage. Les chlorures et les sulfates ont été analysés durant la semaine suivant l'échantillonnage tandis que les cations majeurs, préservés au moyen d'acide nitrique, ont été déterminés durant le mois suivant l'échantillonnage.

I- Alcalinité Gran

Le dosage de l'alcalinité par la méthode classique (APHA, 1976) comprends un titrage avec un acide fort jusqu'à un pH de 4.5; ce qui est




FIGURE 1 Localisation des lacs échantillonnés et parcours hélicoptère.

approximativement le point d'équivalence de la réaction de protonation du bicarbonate.

Cependant, ce titrage a un point fixe (4.5) est peu valable car le pH du point d'inflexion ([H+] \rightarrow [HCO $_3$ -]) est fonction de la concentration totale du carbone inorganique (Jeffries and Zimmerman, 1980). De plus, ce phénomène est beaucoup plus important pour les eaux faiblement minéralisées. Ainsi, un tel titrage dans ces eaux aurait comme conséquence une surestimation de l'alcalinité, puisque le point d'équivalence se situe en général à un pH supérieur à 4.5.

Pour palier à cet inconvénient, nous devons employer la technique de Gran (Stumm and Morgan, 1970), qui consiste à évaluer la résistance d'une eau à une protonation effectuée avec un acide fort (.02N $\rm H_2SO_4$). Les titations ont été effectuées avec une micropipette Gilmont; le contenant était ouvert à l'atmosphère.

Après avoir effectué le titrage, un graphique de $(V_0 + V)$ $[H^+]$ vs V, $(où V_0 = volume de l'échantillon (ml), <math>V = volume du titrant et [H^+]$ la concentration de protons) extrapolé à l'abscisse (V) donne la quantité d'acide nécessaire pour atteindre l'équivalence de la réaction $([H^+] \stackrel{*}{\Rightarrow} [H CO_3^-])$.

Au cours des trois campagnes d'échantillonnage, il y a eu quelques modifications dans le protocole de dosage de l'alcalinité Gran.

Campagne du 23.09.80

Lors de cette première campagne, nous avons effectué des titrations (6/an) sur l'ensemble des échantillons.

Campagne du 19.11.80

Entre les campagnes du 23.09.80 et du 24.02.81, nous avons déterminé, à partir d'étalons de Na_2CO_3 , une limite de détection apparente de 8.3 μ éq.L⁻¹ (= 0.10 mgC.L⁻¹). Lors de la deuxième campagne, les lacs ayant

une alcalinité théorique (calculée au moyen du pH et du CID; voir appendice II) inférieure à cette limite, n'ont pas été analysés. Cependant, un certain nombre de lacs très près de la limite ont été titrés (cas des lacs 2, 7, 18 et 19).

Campagne du 24.02.81

Entre la campagne du 19.11.80 et celle du 24.02.81, il est devenu apparent que la limite de détection était en réalité beaucoup plus faible que ce qui avait été décelée au début de l'étude. En fait, la limite de détection et l'erreur statistique de V à l'abscisse dépend du volume des gouttes ajouté pendant la titration. Leur volume affecte l'intervalle de confiance de la droite de régression, ainsi que l'intervalle de confiance de V. Les valeurs de l'alcalinité obtenues lors de la troisième campagne ont été exprimées à ± 0.001 mgC.L-1, et les valeurs de certains lacs de la deuxième campagne ont été recalculées en utilisant les graphiques de titration obtenus (cas des lacs 2, 7, 18 et 19).

II- Anions

Ch lorures

La technique automatisée pour le dosage des chlorures est basée sur la dissociation de l'ion thiocyanate du thiocyanate mercurique suite à la formation du chlorure mercurique. En présence d'ions ferriques, le thiocyanate forme le thiocyanate ferrique coloré, dont la concentration est proportionnelle à la concentration originale des ions chlorures.

Sulf ates

Les sulfates ont été dosés au moyen d'un auto-analyseur Technicon II. Une solution équimolaire de bleu de méthylthymol et de chlorure de barium est mélangée à l'échantillon à analyser. Le sulfate réagit en présence du barium libérant ainsi une concentration équivalente de bleu de méthylthymol. L'intensité de la couleur grise produite par le bleu de méthylthymol non complexé est ensuite mesurée. L'échantillon est, au préalable, passé à

travers une colonne échangeuse de cations bivalents afin de minimiser leurs interférences. Les anions ont été corrigés pour les embruns marins.

III- Cations

Les éléments majeurs Ca, Mg et Na et l'élément mineur Mn ont été déterminés par spectrophotométrie d'absorption atomique avec flamme (EPA, 1979). Les cations ont été corrigés pour les embruns marins.

Aluminium

L'aluminium total (non-filtré) a été déterminé par spectrophotométrie d'absorption atomique, soit avec flamme (campagne du 23.09.80) ou sans flamme (campagnes du 19.11.80 et du 24.02.81).

IV- Couleur et absorbance à 540 mm

La couleur apparente a été mesurée au moyen d'un comparateur visuel (Hellige, Aquatester) alors que l'absorbance le fut au moyen d'un spectro-photomètre Beckman Acta III. Le spectre d'absorbance des eaux du Bouclier présente une courbe monotonique décroissante (Jackson et al., 1980), la valeur 540 a été retenue à cause d'un maximum d'absorbance observé pour nos eaux. Ce paramètre représente une mesure approximative de la matière organique dissoute.

RESULTATS

Commentaires généraux

Rappelons que les trois campagnes d'échantillonnage ont eu lieu à trois différentes périodes de l'année. La première campagne (23.09.80), avant le retournement des eaux automnal, la deuxième, (19.11.80) peu de temps après la prise des glaces et la troisième (24.02.81) a eu lieu lors d'une réhausse de la température qui a conduit à une fonte importante lors de cette période. Un examen rapide des résultats montre que le pH et l'alcalinité ont diminué au cours des trois campagnes; la diminution la plus marquante ayant lieu entre les deuxièmes et troisièmes missions.

Disposition des résultats

Dans un premier temps, nous avons effectué des graphiques déjà employés par d'autres auteurs (Harvey et al., 1981; Dillon et al., 1980 et Bobée et al., 1981) pour étudier les variations de l'alcalinité en rapport avec quelques éléments majeurs (Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-}). Les principes chimiques et les limites de ces modèles ont été examinés dans les travaux de Bobée et al. (1981) et Kramer et Tessier (1982). Puisque dans notre cas, nous possédons des échantillonnages multiples de lacs, il est instructif de non seulement indiquer la position des lacs, mais également leur déplacement d'une campagne à l'autre sur des graphiques Alc. vs [Ca^{2+} + Mg^{2+}] et SO_4^{2-} vs [Ca^{2+} + Mg^{2+} - Alc]. Ces représentations permettent, dans le cas du premier, de vérifier les écarts entre la proportionnalité de l'alcalinité et [Ca^{2+} + Mg^{2+}], et dans le deuxième, de vérifier les écarts entre les sulfates et les échanges cationiques H^+ Ca $^{2+}$ + Mg^{2+} .

Dans un deuxième temps, et dans le but d'être rigoureux avec les données, nous avons effectué une analyse en composantes principales (ACP) sur les variables, et sur les différences des variables (Allen <u>et al.</u>, 1977). Nous verrons que les graphiques et les analyses numériques mènent aux mêmes conclusions.

Ce rapport contient également deux appendices, le premier examine la condition d'électroneutralité et les déficits anioniques, alors que le deuxième en fait autant pour les relations entre la pression partielle de ${\rm CO}_2$, le pH et l'alcalinité. Pour un traitement rigoureux de tout le système des carbonates, nous référons le lecteur à Bobée <u>et al.</u> (1981) ou Stumm et Morgan (1981).

Graphiques de l'alcalinité vs [Ca²⁺ + Mg²⁺]

Les trois graphiques sont représentés aux figures 2, 3 et 4 avec les droites d'équivalence 1:1 entre l'alcalinité et le Ca^{2+} + Mq^{2+} .

La figure 2 montre que 93% des lacs étaient situés entre deux droites interceptant l'abscisse entre 30 et 67 μ éq.L-1 [Ca²⁺ + Mg²⁺]. Ceci suggere que 93% des bassins versants ont déjà fourni entre 30 et 67 μ éq.L⁻¹ de CEC. Cette représentation statique ne permet pas de savoir si le positionnement des lacs est dû à une baisse d'alcalinité ou à une augmentation de Ca²⁺ + Mg²⁺ dans les eaux par échange cationique sur le bassin versant. La figure 2 montre la localisation des lacs au 19.11.80 par rapport à leur localisation précédente (points noirs). On peut distinguer trois comportements. Les lacs 3 et 4 augmentent leur alcalinité et leur teneur en Ca²⁺ et Mg²⁺. La majorité des lacs semblent se déplacer sur un axe perpendiculaire à la droite d'équivalence; une charge en protons apparaît répartie (cas des lacs 1, 6, 10, 11, 14, 15, 24 et 26). Ainsi, l'augmentation légère de $\left[\operatorname{Ca}^{2+} + \operatorname{Mg}^{2+}\right]$ pourrait être due à la CEC du bassin versant, alors que la légère diminution de l'alcalinité aurait pu être due à un excédent de protons n'ayant pas été échangés sur le bassin versant. Un certain nombre (5, 8, 9 et 27) semble gagner un peu d'alcalinité sans pour autant montrer de changement des éléments majeurs. Etant donné que le mouvement de ces derniers était près de notre limite de détection pour l'alcalinité, il est difficile de leur accorder autant de réalisme que dans les cas précédents.

Lors de la troisième campagne (figure 4), on observe, pour 8 des 11 lacs échantillonnés, très peu d'échanges cationiques, et une baisse massive de l'alcalinité. Selon les données du Service atmosphérique d'Envi-




FIGURE 2 Graphique de l'alcalinité (μ éq.L⁻¹) versus [Ca²⁺ + Mg²⁺] (μ éq.L⁻¹). Distribution des lacs échantillonnés le 23.09.80.




FIGURE 3 Graphique de l'alcalinité (μ éq.L-1) versus [Ca²⁺ + Mg²⁺] (μ éq.L-1). Distribution des lacs échantillonnés le 19.11.80.




FIGURE 4 Graphique de l'alcalinité (μ éq.L $^{-1}$) versus [Ca $^{2+}$ + Mg $^{2+}$] (μ éq.L $^{-1}$). Distribution des lacs échantillonnés le 24.02.81.

ronnement Canada, la quantité de neige au sol à l'aéroport de Québec a diminué de 70% entre le 16 et le 24 février 1981. Cette fonte a également eu lieu au lac Laflamme (J.Y. Charette, communication personnelle). Il semblerait donc qu'en période de fonte intensive et de dilution que peu de CEC puisse avoir lieu sur le bassin versant. Dans cette dernière série de lacs, un certain nombre possédait une surface plus grande (28 \rightarrow 35) et leur alcalinité n'a pas dépassé 25 μ g.L $^{-1}$.

Ces trois graphiques démontrent l'existence d'une variabilité temporelle importante d'une campagne à l'autre, et également, que les variations de l'alcalinité et des éléments majeurs sont fonction du temps de séjour des eaux de ruissellement du bassin versant affectant étroitement la capacité d'échange cationique.

Graphiques des sulfates vs $[Ca^{2+} + Mg^{2+} - Alc]$

L'interprétation des graphiques SO_4^{2-} vs $[Ca^{2+} + Mg^{2+} - Alc]$ n'a pas été aussi aisée. Nous avons découvert que la majorité des lacs se situaient au-dessus de la droite d'équivalence 1:1, SO_4^{2-} : $[Ca^{2+} + Mg^{2+} - Alc]$ (figure 5). Nous verrons que cette anomalie, souvent attribuée à des erreurs de mesure (Harvey et al., 1981 - Lacs de la Whitefish Lake Indian Reserve, p. 185 et Bobée et al., 1981), peut avoir comme cause: 1) une surestimation des sulfates, à cause d'une interférence colorimétrique due à la matière organique dissoute; 2) une sous-estimation du Ca et Mg, peut-être par compléxation avec les acides humiques.

Ainsi, dans la figure 5, seulement les lacs possédant une alcalinité supérieure à $25~\mu g \cdot L^{-1}$ (4, 6, 14 et 21) se retrouvent sur la droite d'équivalence – le bilan ionique de ces lacs est près de zéro (appendice X). La figure 5 montre le déplacement des lacs du 19.11.80 par rapport à la date précédente. Le mouvement des lacs 6 et 14 confirme l'interprétation de la figure 3: seulement 50% des protons sont échangés (pente \simeq 45° – ligne 6 et 14, figure 6).

Les autres lacs sont plus ou moins éloignés de la droite et se divisent en trois comportements. Les lacs qui varient parallèlement à l'axe




FIGURE 5 Graphique des sulfates (μ éq.L $^{-1}$) versus le $\left[\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}\right]$ (μ éq.L $^{-1}$). Distribution des lacs échantillonnés le 23.09.80.




FIGURE 6 Graphique des sulfates (μ éq.L⁻¹) versus le [Ca²⁺ + Mg²⁺] (μ éq.L⁻¹). Distribution des lacs échantillonnés le 19.11.80.




FIGURE 7 Graphique des sulfates (μ éq.L-1) versus [Ca²⁺ + Mg²⁺ - alcalinité] (μ éq.L-1). Distribution des lacs échantillonnés le 24.02.81.

d'équivalence (7, 11, 12, 16, 19, 24 et 26), un deuxième groupe qui se déplace parallèlement à l'abscisse (1, 15, 23 et 27) et un faible nombre qui se trouve perpendiculaire à la droite d'équivalence (4, 5, 8, 9, 17 et 21).

Le premier groupe représente une série de lacs qui échangent une certaine quantité de $\begin{bmatrix} \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} \end{bmatrix}$, mais qui ont au départ un certain nombre de protons associés aux anions non-mesurés - dans ce cas présumément les acides humiques. Dans le deuxième groupe, les lacs 1 et 15 échangent tel que prédit par la figure 2, alors que les lacs 23 et 27 semblent séquestrer davantage de protons sur l'anion non-mesuré. Le troisième groupe est caractérisé par les lacs les plus acides (8, 9 et 17), et leur écart est à la fois dû aux $\begin{bmatrix} \text{H}^+ \end{bmatrix}$ et/ou aux acides humiques. Les lacs (4, 5 et 21) ont un comportement difficilement interprétable.

Dans la figure 6, on remarque pour les lacs rééchantillonnés l'effet d'un apport important de SO_4^{2-} avec une diminution concomitante de $[Ca^{2+} + Mg^{2+} - Alc]$.

INTERPRETATION DES ANALYSES EN COMPOSANTES PRINCIPALES

Matrices des corrélations entre variables

Première envolée

La matrice de corrélation est présentée sur le tableau 1 et les deux premiers axes de l'ACP sont représentés à la figure 8. Les variables associées à l'alcalinité sont regroupées sur le premier axe alors que la couleur et l'aluminium total sont voisins du deuxième axe. Parmi les observations (lacs), il est plus facile de localiser les lacs exceptionnels, les lacs à grand bassin versant (19), les lacs à petit rapport Sb/Sl (2, 5, 26), les lacs à faible pH et couleur +Al élevées (dystrophes?) (8, 9) et les lacs à pH et alcalinité élevés (15, 21).

Deuxième envolée

La matrice de corrélation et les deux premiers axes de l'analyse en composantes principales sont au tableau 2 et à la figure 9 respectivement. Les regroupements sont presque identiques à ceux de la première envolée, mais l'axe horizontal est davantage relié aux changements de pH, les regroupements étant décalés de 45° par rapport à la première passe. L'alcalinité est associée au calcium et au magnésium, alors que la couleur, l'absorbance à 540 nm et les deux analyses d'aluminium sont regroupés ensemble. Comme dans le cas précédent, les lacs sont répartis à l'intérieur des facteurs d'observations (descripteurs) à l'exception des mêmes lacs mentionnés ci-haut.

Troisième envolée

Lors de la troisième passe, un certain nombre de lacs ont été éliminés et d'autres ajoutés (28 + 35) (tableau 3, figure 10). La surface du bassin versant apparaît dans le regroupement 'couleur, absorbance à 540 nm, aluminium total et filtré'. Les deux premiers axes séparent la variation de la conductivité de la variation du pH et de la surface du lac. Le sodium a été davantage échangé et apparaît avec le calcium et le magnésium.

TABLEAU 1 Coefficients de corrélation - Campagne du 23.09.80.

	рН	Cd	Со	C1	Ac	с1	S4	Na	Ca	An	Mg	\$1	Sb
рH	1.00000												
Cđ	0.14595	1.00000		·									
Со	-0.33125	0.11000	1.00000										.
C1	0.49538**	0.56610**	0.02103	1.00000									. [
Ac	0.76418**	0.58444**	-0.13426	0.81632**	1.00000								
С1	-0.14970	0.30269	0.81488**	0.08478	0.04867	1.00000						:	
S4	-0.21861	0.46387*	0.16146	-0.05376	-0.04724	0.14760	1.00000		,				
Na	0.68710**	0.65292**	0.03964	0.73959**	0.82592**	0.33651	0.10142	1.00000					
Ca	0.69343**	0.70594**	-0.10553	0.64001**	0.80354**	0.11008	0.26985	0.83782**	1.00000				
An	-0.66519**	0.33117	0.40816*	-0.28500	-0.39786*	0.35269	0.24063	-0.26526	-0.19693	1.00000			
Mg	0.76526**	0.60976**	-0.04179	0.74832**	0.83560**	0.15148	0.09658	0.93136**	0.88404**	-0.34621	1.00000		
SI	0.01607	-0.45796**	-0.31326	-0.34352	-0.22243	-0.32348	0.01757	-0.29398	-0.23791	-0.27728	-0.25831	1.00000	
Sb	-0.07445	0.03371	0.13372	-0.17073	-0.11425	0.11633	0.19037	-0.04765	0.08278	0.28607	-0.04105	0.53039**	1.00000

* P < 0.05

** P < 0.01

Désignation des symboles:

Cd = conductivité Co = couleur Ci = carbone inorganique total

Ac = alcalinité Cl = chlorures

S4 = sulfates

Na = sodium

Ca = calcium
An = aluminium total
Mg = magnésium
S1 = surface du lac

Sb = surface du bassin versant




FIGURE 8 Projection des deux premiers axes de l'analyse en composantes principales effectuée sur la matrice du tableau l.

Symbolisme: chiffres = numéro du lac; lettres = voir tableau l.

TABLEAU 2 Coefficients de corrélation - Campagne du 19.11.80.

	Ab	рН	Cd	Со	Ci	Ac	C1	S 4	Na	Ca	An	Mg	Af	\$1	Sb
Ab	1.00000														
рН	-0.61595**	1.00000					:								
Cq	0.12420	-0.04565	1.00000												
Co	0.84271**	-0.44969*	0.15194	1.00000									ļ		
Ci	0.00536	0.09319	0.48122*	0.14280	1.00000										
Ac	-0.32704	0.66679**	0.48619*	-0.22698	0.51225**	1.00000									
C1	0.70512**	-0.35428	0.29323	0.76607**	0.30527	-0.16631	1.00000								
S4	0.22397	-0.36755	0.39342*	0.20741	-0.07862	-0.18310	0.06217	1.00000							
Na	-0.14569	0.37508	0.02587	-0.08971	0.17659	0.36862	-0.05352	-0.32678	1.00000						
Ca	-0.21516	0.67075**	0.61860**	-0.02439	0.42322**	0.74365**	0.11670	0.11825	0.23815	1.00000					
An	0.64390**	-0.77098**	0.28208	0.61019**	0.23322	-0.37747	0.61098**	0.38939*	-0.28416	-0.27623	1.00000				
Mg	-0.19623	0.72953**	0.45595*	-0.03866	0.45211**	0.86254**	0.03647	-0.10460	0.38491*	0.89249**	-0.33627	1.00000			
AF	0.62313**	-0.80361**	0.35912	0.53528**	0.08288	-0.32276	0.49832**	0.39388*	-0.23572	-0.35620	0.80766**	-0.41888*	1.00000		
SI	-0.09916	-0.00275	-0.43418*	-0.17145	-0.59113**	-0.33203	-0.33288	-0.04615	-0.10950	-0.28677	-0.23654	-0.25789	-0.29191	1.00000	
Sb	0.16474	-0.12891	-0.03643	0.21099	-0.03960	-0.24464	0.19559	0.12719	-0.03963	0.01737	0.37798*	-0.01642	0.01054	0.53039**	1.00000

^{*} P ≤ 0.05

Désignation des symboles: (voir tableau 1)

Ab = absorbance

Af = aluminium filtré




FIGURE 9 Projection des deux premiers axes de l'analyse en composantes principales effectuée sur la matrice du tableau 2. Symbolisme: voir figure 8.

TABLEAU 3 Coefficients de corrélation - Campagne 24.02.81.

	Ab	рН	Cd	Со	Ac	CI	S4	Na	Ca	An	Mg	Af	S 1	Sb
Ab	1.00000													
рН	-0.54524*	1.00000					· 							
Cd	0.49185*	-0.14946	1.00000											
Co	0.76604**	-0.08985	0.26792	1.00000				·			ļ			1 1
Ac	-0.09763	0.61054**	0.22898	0.19022	1.00000			:						
С1	0.70605**	-0.38459	0.63609**	0.57786**	0.01852	1.00000								
S4	0.42733	0.14981	0.70732**	0.46875*	0.22095	0.24016	1,00000							
Na	0.22385	0.34355	0.75041**	0.32163	0.72972**	0.52503*	0.56782*	1.00000						1
Ca	0.27692	0.30732	0.78908**	0.36181	0.65282**	0.50608*	0.66984**	0.92996**	1.00000		:]			
An	0.45849	-0.52292*	0.23522	0.34466	-0.15514	0.43011	0.14224	0.06521	0.16611	1.00000		·		
Mg	0.29796	0.34007	0.71223**	0.39669	0.75281**	0.45735	0.60603**	0.90757**	0.97277**	0.15984	1.00000			
Æ	0.76940**	-0.64478**	0.56722*	0.46218	-0.19324	0.76561**	0.26156	0.24147	0.23818	0.47883*	0.20675	1.00000		
Sī	-0.05548	-0.18170	-0.12476	-0.12927	-0.23617	-0.32151	-0.02767	-0.31333	-0.36422	-0.05323	-0.35234	-0.02807	1.00000	
Sb	0.46579*	-0.20867	0.10873	0.42483	-0.05872	0.40654	0.04919	0.05215	0.00199	0.23379	0.02350	0.52715*	-0.04397	1.00000

^{*} P < 0.05 ** P < 0.01

Désignation des symboles: (voir tableau 1)

Ab = absorbance




FIGURE 10 Projection des deux premiers axes de l'analyse en composantes principales effectuée sur la matrice du tableau 3.

Symbolisme: voir figure 8.

Matrices des corrélations entre différences des variables

Première et deuxième envolées

La matrice de corrélation et la représentation des deux premiers axes de l'analyse en composantes principales sont présentées au tableau 4 et à la figure 11 respectivement. Sur le premier axe, la conductivité est regroupée avec les éléments majeurs, alors que le deuxième axe regroupe l'alcalinité, le carbone inorganique, l'aluminium total et les surfaces de lacs et de bassins versants.

Première et troisième envolées

La matrice de corrélation et la représentation des deux premiers axes sont présentées au tableau 5 et à la figure 12 respectivement. Le regroupement et la séparation sont ici très supérieurs par rapport à la comparaison précédente. Les éléments majeurs et l'alcalinité sont regroupées sur le premier axe avec la conductivité, alors que le deuxième axe regroupe la concentration des ions hydrogène et l'aluminium total à une extrémité et les surfaces de lacs et bassins versants à l'autre. La disposition des lacs est également très intéressante. Les lacs possédant une capacité tampon relativement élevée sont très voisins du premier axe (lacs 1, 3, 4, 19, 20, 23, 24) alors que ceux possédant de grands bassins versants et des concentrations en [H+] élevées (7, 25) sont voisins du deuxième axe.

Deuxième et troisième envolées

Cette comparaison s'est avérée la plus sensible, vraisemblablement parce que les deux périodes d'échantillonnage ont eu lieu sous le couvert de glace. Comme dans les deux cas précédents, le premier axe (tableau 6, figure 13) regroupe la conductivité, l'alcalinité et les éléments majeurs à une extrémité alors que l'aluminium total et le sodium se retrouve à l'extrémité opposée. Etant donné que la troisième envolée a eu lieu en période de fonte intense, ce petit regroupement de Al et Na reflète un lessivage intensif (Harvey et al., 1981) qui a eu lieu à la fin du mois de

TABLEAU 4 Coefficients de corrélation - Campagnes 1 - 2.

	[H+j	Cd	Со	C1	Ac	C1	S4	Na	Ca	An	Mg	\$1	Sb
[#+]	1.00000												
Cd	0.41892*	1.00000											
Co	-0.24653	0.03622	1.00000										
C1	-0.11512	0.10377	-0.31607	1.00000									
Ac	0.00336	-0.07702	-0.25969	0.45460*	1.00000		;						
C1	0.11519	0.48765**	0.35845	-0.07747	0.02124	1.00000							
S4	0.16798	0.58000**	0.31342	0.08526	-0.03309	0.70295**	1.00000						
Na	0.00991	0.16920	0.23325	0.03759	0.15077	0.49526**	0.23685	1.00000					
Ca	-0.18716	0.53773**	0.06656	0.16354	-0.07538	0.14061	0.42258*	-0.01962	1.00000				
An	0.34855	0.09327	-0.25282	0.35765	0.14089	-0.00135	0.13819	-0.04495	-0.10634	1.00000			
Mg	0.04979	0.32274	-0.01657	0.18554	-0.24055	-0.10201	-0.05674	0.10453	0.12848	0.03895	1.00000		
sı	0.09411	0.15705	-0.30342	0.42612*	0.22255	-0.13504	0.09133	-0.08976	0.24507	0.11866	-0.05827	1.00000	
Sb	0.15186	0.11478	-0.09533	-0.07086	0.26329	-0.03957	0.04976	0.00659	0.12758	-0.34480	-0.14136	0.53039**	1.00000

^{*} P < 0.05 ** P < 0.01

Désignation des symboles: voir tableau 1




FIGURE 11 Projection de deux premiers axes de l'analyse en composantes principales effectuée sur la matrice du tableau 4. Symbolisme: voir figure 8.

TABLEAU 5 Coefficients de corrélation - Campagnes 1 - 3.

	[H+]	Cd	Со	Ac	C1	S4	Na	Ca	An	Mg	S1	Sb
[#+]	1.00000											
Cd	0.24042	1.00000										
Со	-0.78479**	0.01564	1.00000								ĺ	
Ac	-0.58977	0.31949	0.50149	1.00000								
CI	-0.37154	0.73325**	0.60444*	0.57472	1.00000	<u> </u>						
S4	-0.08996	0.84553**	0.25514	0.44008	0.75493**	1.00000						
Na	-0.30102	0.80556**	0.47414	0.60143*	0.92266**	0.86153**	1.00000					
Ca	-0.16780	0.68381*	0.23796	0.68736*	0.64763*	0.80661**	0.63794*	1.00000				
An	0.55390	-0.19027	-0.39774	-0.16567	-0.37945	-0.26542	-0.35838	-0.11548	1.00000		!	
Mg	-0.08558	0.87236**	0.22660	0.51057	0.73048**	0.81650**	0.85889**	0.63369*	-0.44932	1.00000] -
SI	-0.35197	-0.15460	0.06794	0.17060	-0.09502	0.03886	-0.18555	0.31146	-0.41749	0.05805	1.00000	
Sb	-0.69416*	-0.50821	0.50535	0.21126	-0.12118	-0.13825	-0.22994	0.10113	-0.31640	-0.27021	0.66965*	1.00000

^{*} P < 0.05 ** P < 0.01

Désignation des symboles: voir tableau 1




FIGURE 12 Projection des deux premiers axes de l'analyse en composantes principales effectuée sur la matrice du tableau 5.

Symbolisme: voir figure 8.

TABLEAU 6 Coefficients de corrélation - Campagnes 2 - 3.

	Ab	[H+]	Cd	Со	Ac	Cl	S4	Na	Ca	An	Mg	Af	S1	Sb
Ab	1.00000													
[#+]	-0.01385	1.00000												
Cd	0.58697	-0.08402	1.00000											
Со	0.34871	-0.56112	-0.15827	1.00000										
Ac	0.40809	-0.67852*	0.49523	0.44409	1.00000									
CI	0.64138*	-0.08686	0.39462	0.13640	0.46163	1.00000								
S4	0.70164*	-0.12414	0.78766**	0.14176	0.48949	0.41368	1.00000							
Na	-0.44369	-0.00241	-0.28552	-0.35772	-0.17610	-0.16696	-0.02351	1.00000						
Ca	0.62498*	-0.57229	0.67293*	0.51814	0.90272**	0.41059	0.64548*	-0.39089	1.00000					
An	0.05569	0.59235	-0.33204	-0.02798	-0.40022	-0.12249	-0.26151	0.06689	-0.26040	1.00000				
Mg	0.59662	-0.38148	0.76011**	0.13443	0.74364**	0.60502*	0.72499*	-0.22503	0.75560**	-0.50750	1.00000			
AF	-0.18848	0.31737	0.24215	-0.41401	0.12503	-0.10882	0.19085	0.20197	0.04872	0.07440	0.31949	1.00000		
Sī	0.15813	-0.31021	-0.35663	0.44521	0.19088	0.10358	0.09939	0.09242	0.01439	-0.31308	0.06876	-0.26600	1.00000	
Sb	0.21827	-0.48871	-0.31359	0.70898*	0.11161	-0.06392	-0.01614	-0.20537	0.15231	-0.15776	-0.19589	-0.78975**	0.66965*	1.00000

^{*} P < 0.05 ** P < 0.01

Désignation des symboles: voir tableau 1






FIGURE 13 Projection des deux premiers axes de l'analyse en composantes principales effectuée sur la matrice du tableau 6.

Symbolisme: voir figure 8.

février. Le deuxième axe présente les paramètres morphométriques et la couleur à l'extrémité supérieure alors que l'aluminium passant à travers un filtre Nuclepore 1 µm se retrouve à l'extrémité opposée. La relation exacte entre l'aluminium et l'absorbance (ou la couleur) sera examinée plus loin (section aluminium total et filtré).

ALUMINIUM TOTAL ET ALUMINIUM FILTRE

Les concentrations en aluminium non filtré ont varié entre < 20 et 578 $\mu g.L^{-1}$. Les relations entre le pH et l'aluminium total ne se sont pas avérées très bonnes. Une meilleure compréhension de la dynamique de l'aluminium a été obtenue à partir des valeurs d'aluminium filtré (passant à travers un filtre Nuclepore 1.0 μ). Un indice de cette dynamique a déjà été perçu lors de l'analyse en composantes principales: un regroupement de l'aluminium, de la couleur et de l'absorbance a souvent été observé, et un deuxième regroupement impliquant la surface du bassin versant est également apparu.

Lorsqu'on effectue le calcul des complexes connus d'aluminium au pH des lacs (tableau 7) et qu'on les soustrait des valeurs mesurées, on obtient une droite entre l'absorbance à 540 nm (maximum d'absorbance pour nos eaux = matière organique + acides humiques) et les valeurs résiduelles d'aluminium (figure 14). Ceci suggère que lorsqu'on tient compte des complexes inorganiques, la majorité des autres complexes de l'aluminium sont associés à la matière organique. Les rapports aluminium total / aluminium filtré n'ont pas varié de façon systématique avec le pH, la couleur ou les surfaces de bassins versants.

TABLEAU 7 Calcul des hydroxo-complexes d'aluminium.

$$A1_{T} = [A1^{+3}] + [A10H^{+2}] + [A1(0H)_{2}^{+}] + [A1(0H)_{3}] + [A1(0H)_{4}^{-}]$$
 (1)

$$K_s = [A1^{+3}] [0H^-]^3 = 10^{-33.5}$$
 (2)

$$K_1 = \frac{[A10H^{+2}]}{[A1^{+3}]} = 10^{9 \cdot 1}$$
(3)

$$K_2 = \frac{[A1(0H)_2^+]}{[A1^{+3}]} = 10^{18.7}$$
(4)

$$K_3 = \frac{[A1(0H)^0_3]}{[A1][0H^-]^3} = 10^{27 \cdot 0}$$
 (5)

$$K_4 = \frac{\left[A1(0H)^{-}_{4}\right]}{\left[A1^{+3}\right]\left[0H^{-}\right]^{4}} = 10^{33 \cdot 0}$$
(6)

(1) devient:

$$A1_{T} = [A1^{+3}] \{1 + \kappa_{1}[OH^{-}] + \kappa_{2}[OH^{-}]^{2} + \kappa_{3}[OH^{-}]^{3} + \kappa_{4}[OH^{-}]^{4}\}$$
 (7)

(2) dans (7):

$$A1_{T} = \frac{\kappa_{s}}{[OH^{-}]^{3}} \{1 + \kappa_{1}[OH^{-}] + \kappa_{2}[OH^{-}]^{2} + \kappa_{3}[OH^{-}]^{3} + \kappa_{4}[OH^{-}]^{4}\}$$
(8)

Smith et Martell (1976) "Critical Stability Constants" Plenum Press, N.Y.




FIGURE 14 Graphique de l'aluminium soluble – $[Al^{3+}]$ + $[Al(OH)_X]$ (µg.L⁻¹) versus absorbance à 540 nm. Chiffres = distribution des lacs.

CONCLUSIONS

- C1 Cette étude a révélé que les lacs échantillonnés ne possèdent qu'une très faible capacité à neutraliser un acide fort.
- C2 D'une période d'échantillonnage à l'autre, une variabilité temporelle importante a été détectée, mais puisque pour une période donnée, la direction de variation des lacs a été semblable, il est possible d'effectuer des comparaisons inter-lacs lorsqu'ils sont échantillon-nés au même moment.
- Pour satisfaire la condition d'électroneutralité, il est important d'examiner la contribution des acides humiques. Cette étude pourrait se faire à partir de titrations minutieuses de la partie inférieure des graphiques de Gran.
- Une interaction de l'aluminium avec les acides humiques ayant été démontrée, il est maintenant nécessaire, pour des lacs possédant des quantités d'aluminium et d'acides humiques variables, d'évaluer comment leur interaction affecte la capacité tampon.

RECOMMANDATIONS

- Puisque cette étude a démontré une variabilité temporelle importante, il est fort probable que des différences significatives du taux d'acidification annuel ne pourront être évaluées rigoureusement qu'à partir d'études de bassins versants calibrés; le bilan ionique annuel étant, pour ces derniers, beaucoup plus fiable que quelques passages sporadiques sur des lacs à caractéristiques morphométriques (temps de contact: pluie bassin versant lac) variables. Donc, sur le plan de l'efficacité scientifique, il serait souhaitable de mener une ou deux autres études semblables au projet du lac Laflamme, mais sur des lacs possédant des réserves alcalines plus faibles.
- R2 Il serait intéressant de pouvoir mieux prédire la capacité d'échange cationique des bassins versants en fonction de l'épaisseur et de la composition géologique des sédiments meubles. Cette étude pourrait être menée sur une base épisodique en étiage d'été. Il s'agirait, au moyen d'un échantillonneur automatique, de décomposer un événement de pluie (Δt = minutes) et d'examiner les relations entre l'intensité de pluie, le volume ruissellé et les teneurs en éléments majeurs et mineurs.
- R3 Schindler et al. (1980) ont découvert que 62% de la capacité tampon du lac 223 était attribuable à la réduction des sulfates et à la relâche de Fe en période d'anaérobie des eaux hypolimnétiques. Rappelons que le volume hypolimnétique du lac 223 équivaut à 6% du volume du lac!

Ce résultat suggère qu'un bilan redox complet des eaux hypolimnétiques anaérobiques des lacs profonds du Bouclier serait probablement un moyen plus sensible pour détecter un taux d'acidification annuel que des mesures intégrées de la colonne d'eau.

APPENDICE I - LA CONDITION D'ELECTRONEUTRALITE DANS LES EAUX DU BOUCLIER CANADIEN

Selon la condition d'électroneutralité, l'alcalinité peut être reconstituée à partir des relations suivantes:

$$\sum$$
 Cations + \sum Anions = 0 (1)

ou

$$(Na^{+})_{0} + (K^{+})_{0} + (Ca^{2+})_{0} + (Mg^{2+})_{0} + (Fe^{2+})_{0} + (Mn^{2+})_{0}$$

$$+ (HCO_{3}^{-})_{0} - (C1^{-})_{0} - (SO_{4}^{-})_{0} - (NO_{3}^{-})_{0} = 0$$

$$(2)$$

et l'alcalinité "originale" serait alors:

$$HCO_{3}^{-} = (Na^{+})_{0} + (K^{+})_{0} + (Ca^{2+})_{0} + (Mg^{2+})_{0} + (Fe^{2+})_{0}$$

$$+ (Mn^{2+})_{0} - (Cl^{-})_{0} - (SO_{4}^{-})_{0} - (NO_{3}^{-})_{0}$$
(3)

Cette approche n'est rigoureusement applicable que dans des milieux inorganiques où les cations et anions sont sous formes nonprotolytiques et donc chargés.

Les eaux du bouclier contiennent des quantités variables et souvent importantes de matière organique (acides humiques) possédant une charge négative ce qui peut favoriser la formation de complexes mixtes: Ca - AH ou AH - AI - PO_{a} .

Etant donné la complexité chimique des acides humiques, les constantes d'ionisation ne sont pas bien connues, et pour quantifier leur contribution anionique, il est nécessaire d'effectuer une titration judicieuse ayant au préalable purger le CO_2 du système (Brosset, 1979).

D'autre part, les eaux du bouclier ont une force ionique excessivement faible, ce qui peut conduire à des complexes mixtes comme, par exemple, acide humique - Ca (Kramer, communication personnelle). Dans ce cas, le Ca $^{2+}$ n'a pas de charge, mais il est quand même mesuré lorsqu'on effectue l'analyse du Ca $^{2+}$ par absorption atomique. Ceci conduit à une surestimation du Ca $^{2+}$ puisqu'il représente en réalité la somme de [Ca $^{2+}$ + AH - Ca].

Donc, en se référant à l'équation (3), il est évident qu'une sousestimation anionique, ou une surestimation du ${\rm Ca}^{2+}$, aura comme résultat une surestimation de l'alcalinité.

Il semblerait que cette surestimation pourrait être assez importante; pour le lac 223, elle a été de 36% (Schindler et al., 1980, tableau 3, p. 349: $ALK_D = [-20 + (-16) = 36]$).

TABLEAU A1 Déficits anioniques

K			
Campagne	1	2	3
Lacs	μeq.L ⁻¹	μeq.L ⁻¹	μeq.L ⁻¹
DESLAURIER	-25.3	- 5.6	- 9.3
LANORAIE	+ 0.6	- 8.5	-22.0
ABSOLON	-14.9	- 8.5	-12.7
BEAUDRY	+ 8.5	- 8.5	-65.3
BOURASSA AUBERT	-11.7	-28.3	-
MC LISH	+ 2.1	+ 9.0	- 9.2
BROSSEAU	- 9.9	+ 9.6	- 9.2
ST-EDOUARD	-21.16 -53.9	-38.4	-
ST-EDUCARD ST-GUILLAUME	-53.9 -22.9	-56.9 -19.8	-
SEBASTIEN	-22.9 - 8.5	- 19.0 - 2.9	
DEMERS	-21.26	-35.2	_
CHAUVEAU	-13.9	-39.1	
TALAYARDE	- 0.1	+17.3	+ 9.3
PETIT GOUAT	-26.8	- 1.4	_ ' _ '
GOUAT	- 8.9	- 6.1	_
STE-ANNE	-27.40	-48.8	_
EBOULI	-23.1	-18.2	-38.7
CRYSTAL	-24.9	-16.7	
ANTOINE	-16.8	-20.4	-34.2
CROCHE	+ 2.1	-15.3	-
MATHIEU	-20.8	-26.2	_
CLARK	-18.2	-22.3	-37.7
CANNOX	+32.6	-20.4	-50.0
BOUTEILLE	-16.3	-24.4	-34.2
JOSSELIN	- 5.4	-14.5	-
HUDON	- 0.984	-13.8	-
MOUTENDRE	-	-	-51.6
SANSSOUCY	-	-	-34.0
TENTANT	-	-	-38.9
LAVIGNE	-	-	-16.8
CHAGNON	-	-	-28.2
FRAZIE	-	-	-25.0
PHILIPPE BAKYS	-	-	-23.5
DWVIO	<u>-</u>	-	-28.9

APPENDICE II - RELATIONS ENTRE LE pH, LE CARBONE INORGANIQUE TOTAL ET L'ALCALINITE CALCULEE

Lorsqu'on considère que le système des carbonates est responsable de la majeure partie de la capacité tampon, on peut, à partir du pH et du carbone inorganique total (CIT), recalculer une alcalinité. Les eaux du Bouclier canadien sont en général sursaturées en CO₂ (2 - 3X) par rapport à la concentration atmosphérique (Schindler et al., 1980; Hesslein et al., 1980) à cause, principalement, d'une relâche de CO₂ à l'interface eausédiment des sédiments epilimnétiques lors de la dégradation de la matière organique allochtone. Il devient donc très difficile, lors du prélèvement, le transport et l'analyse d'un échantillon, de maintenir la concentration du CO₂ dissous à celle du milieu naturel. Puisqu'il y a des pertes par volatilisation, le CIT est souvent sous-estimé, ce qui entraîne une sous-estimation de l'alcalinité calculée par rapport à l'alcalinité Gran. En revanche, cette dernière est indépendante de la pression partielle de CO_2 , puisque pour chaque molécule de CO_2 perdue, il y a dissociation de l'eau selon: $H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$ et le radical hydroxyl conserve la charge négative qui est par la suite dosée lors de la titration de Gran. Nous avons mesuré le CIT lors des deux premières campagnes, et par la suite, nous l'avons abandonné, non seulement à cause des problèmes de CO₂, mais également parce que la méthode analytique n'était pas très reproductible aux très faibles valeurs rencontrées dans les eaux du Bouclier. Au tableau A2, nous pouvons apercevoir les écarts (Δ) entre l'alcalinité calculée et l'alcalinité de Gran. Les écarts étaient, en général, plus élevés le 23.09.80 que le 19.11.80, ceci vraisemblablement à cause d'un délai plus long entre le prélèvement et l'analyse des échantillons de la première passe.

Donc, les dosages de CIT ne devrons être effectuer que s'il est possible de les faire immédiatement après le prélèvement et avec une méthodologie sensible (Stainton et al., 1974).

TABLEAU A2 Comparaison des alcalinités calculées et de Gran.

DATES			23.09.8	0		19.11.80							
LACS	рН	TIC µM	ALC CALC µeq.1-1	ALC GRAN µeq.1-1	Δ μeq.1 ⁻¹	рН	TIC µM	ALC CALC peq.1-1	ALC GRAN µeq.1-1	Δ μeq.1-1			
DESLAURIER	5.79	50.0	11.7	26.7	-15.0	5.51	100.0	14.2	20.8	- 6.7			
LANORAIE	5.71	29.2	5.8	10.0	- 4.2	5.59	58.3	9.2	8.3	+ 0.8			
ABSOLON	5.97	62.5	20.0	26.7	- 6.7	5.97	133.3	42.5	35.0	+ 7.5			
BEAUDRY	6.62	66.7	45.0	32.5	+12.5	5.92	200.0	59.2	53.3	+ 5.8			
BOURASSA	5.20	29.2	2.5	0.1	+ 2.4	5.30	33.3	3.3	8.3	- 5.0			
AUBERT	6.14	83.3	33.3	32.5	+ 0.8	5.90	91.7	25.8	23.3	+ 2.5			
MC LISH	5.77	66.7	15.0	26.7	-11.7	5.23	108.3	8.3	8.3	0			
BROSSEAU	4.98	33.3	1.7	8.3	- 6.7	4.64	108.3	2.5	8.3	- 5.8			
ST-EDOUARD	4.67	50.0	1.1	8.3	- 7.2	4.49	58.3	0.8	8.3	- 6.7			
ST-GUILLAUME	5.45	58.3	6.7	14.2	- 7.5	5.16	100.0	6.7	8.3	- 1.7			
SEBASTIEN	5.58	108.3	17.5	20.0	- 2.5	5.38	133.3	14.2	9.2	+ 5.0			
DEMERS	4.82	41.7	1.7	6.7	- 5.0	4.80	191.7	5.8	8.3	- 2.5			
CHAUVEAU	5.33	29.2	6.7	8.3	- 1.7	5.11	83.3	5.0	8.3	- 3.3			
TALAYARDE	5.93	50.0	15.0	26.7	-11.7	5.50	75.0	10.0	12.5	- 2.5			
PETIT GOUAT	6.54	150.0	95.0	87.5	+ 7.5	6.18	166.7	71.7	75.8	- 4.2			
GOUAT	5.64	41.7	7.5	10.8	- 3.3	5.70	41.7	8.3	8.3	0			
STE-ANNE	5.16	45.8	3.3	5.0	- 1.7	4.80	66.7	1.7	8.3	- 6.6			
EBOULI	5.98	33.3	10.8	19.2	- 8.3	5.62	58.3	10.0	8.3	+ 1.7			
CRYSTAL	6.34	41.7	21.7	30.0	- 8.3	5.60	58.3	10.0	8.3	+ 1.7			
ANTOINE	5.76	50.0	10.8	17.5	- 6.7	5.45	83.3	10.0	12.5	- 2.5			
CROCHE	6.36	91.7	49.2	42.5	+ 6.7	6.07	83.3	16.7	44.2	-27.5			
MATHIEU	5.51	54.2	7.5	11.7	- 4.2	5.15	58.3	4.2	8.3	- 4.2			
CLARK	5.77	41.7	9.2	16.7	- 7.5	5 .6 8	83.3	15.8	14.2	+ 1.7			
CANNOX	6.12	50.0	20.0	35.0	-15.0	5.71	66.7	13.3	25.8	-12.5			
BOUTEILLE	5.42	29.2	3.3	9.2	- 5.8	5.25	<16.7	1.7	8.3	- 6.7			
JOSSELIN	5.94	25.0	7.5	17.5	-10.0	5.88	58.3	15.0	10.0	- 5.0			
HUDON	4.92	25.0	0.8	8.3	- 7.5	5.08	150.0	8.3	8.3	0			

EXEMPLE D'UN CALCUL DE L'ALCALINITE A PARTIR DU pH ET DU CARBONE INORGANIQUE TOTAL

On suppose:

pH = 6.20
CIT
$$\neq$$
 29.0 mg CaCO₃.L⁻¹
= 3.5 mg C.L⁻¹
= 2.9 x 10⁻⁴ M

$$[A1c] = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{-2}] + [OH^-] - [H^+]$$

$$= \frac{\text{CIT} \cdot K_1 [H^+]}{[H^+]^2 + K_1[H^+] + K_1K_2} + \frac{2(\text{CIT}) K_1K_2}{[H^+]^2 + K_1[H^+] + K_1K_2} + [OH^-] - [H^+]$$

$$= \frac{2.9 \times 10^{-4} \text{M} \times 10^{-6 \cdot 3} \times 10^{-6 \cdot 2}}{[10^{-6 \cdot 2}]^2 + 10^{-6 \cdot 3} \cdot 10^{-6 \cdot 2} + 10^{-6 \cdot 3} \times 10^{-10 \cdot 2}} + \frac{2 \times 2.9 \times 10^{-4} \times 10^{-6 \cdot 3} \times 10^{-10 \cdot 2}}{[10^{-6 \cdot 2}]^2 + 10^{-6 \cdot 3} \cdot 10^{-6 \cdot 2} + 10^{-6 \cdot 3} \times 10^{-10 \cdot 2}} + 10^{-7 \cdot 8} - 10^{-6 \cdot 2}$$

$$= \frac{2.9 \times 10^{-16.5}}{10^{-12.4} + 10^{-12.5}}$$

$$= \frac{2.9 \times 10^{-16.5}}{7.1 \times 10^{-13}}$$

$$= 0.41 \times 10^{-3}$$
 M CaCO₃

$$= 1.30 \times 10^{-4} \text{ M CaCO}_3$$

= $13.0 \text{ ppm } CaCO_3 (1.56 \text{ ppm } C)$

APPENDICE III

RELATIONS MORPHO-EDAPHIQUES




FIGURE C1 Relation entre l'alcalinité au point total d'inflection (μ éq.L $^{-1}$) versus surface du bassin versant (km²).




FIGURE C2 Relation entre la superficie du bassin et la superficie des lacs échantillonnés.

APPENDICE IV

TABLEAUX DES RESULTATS DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

TABLEAU A3

Résultats de la campagne du 23.09.80

NOM DU LAC		рН	Cond.	Couleur	t.i.c.	Alcalinité	Cl	SO	Na	Ca	Ma	Mn	Δ1
			umho.cm-1	mg Pt·L-1	mgC.L-1	mgC.L-1	mg.L-1	SO ₄ mg.[-1	mg .L-1	mg .L~1	mg .L-1	mg .L-1	mg .L-1
DESLAURIER	1	5.79	16.5	50	0.60	0.32	1.0	4.2	0.71	1.3	0.35	0.02	<0.10
LANORAIE	2	5.71	9.5	10	0.35	0.12	0.34	2.6	0.40	0.81	0.21	0.03	<0.10
ABSOLON	3	5.97	14.0	40	0.75	0.32	0.78	3.7	0.64	1.3	0.34	<0.02	0.10
BEAUDRY	4	6.62	15.5	20	0.80	0.39	0.34	3.2	0.64	1.5	0.43	<0.02	<0.10
BOURASSA	5	5.20	12.0	5	0.35	<0.001	0.31	3.3	0.34	0.85	0.20	0.03	<0.10
AUBERT	6	6.14	15.5	10	1.0	0.39	0.44	2.9	0.60	1.4	0.34	0.03	<0.10
MC LISH	7	5.77	13.5	70	0.80	0.32	0.88	3.4	0.52	1.4	0.27	0.06	0.14
BROSSEAU	8	4.98	13.0	50	0.40	0.020	0.69	4.0	0.45	1.0	0.21	0.02	0.23
ST-EDOUARD	9	4.67	17.0	40	0.60	-0.150	0.53	4.0	0.37	0.71	0.16	<0.02	0.27
ST-GUILLAUME	10	5.45	14.0	40	0.70	0.17	0.63	4.0	0.55	1.1	0.28	0.02	0.12
SEBASTIEN	11	5.58	16.0	40	1.3	0.24	0.63	3.7	0.56	1.3	0.33	0.02	0.12
DEMERS	12	4.82	16.0	3 0	0.50	0.080	0.50	3.6	0.38	0.95	0.19	0.03	0.20
CHAUVEAU	13	5.33	15.0	30	0.35	0.080	0.44	4.2	0.45	1.3	0.22	0.02	0.16
TALAYARDE	14	5.93	18.0	30	0.60	0.32	0.88	3.4	0.70	1.5	0.33	<0.02	0.25
PETIT GOUAT	15	6.54	23.0	5	1.8	1.05	0.44	4.2	0.90	2.2	0.51	<0.02	<0.10
GOUAT	16	5.64	15.5	5	0.50	0.13	0.38	4.2	0.51	1.4	0.27	<0.02	0.17
STE-ANNE	17	5.16	14.5	30	0.55	0.060	0.40	4.5	0.40	1.1	0.23	0.05	0.17
EBOULI	18	5.98	16.0	5	0.40	0.23	0.48	4.5	0.57	1.4	0.28	0.05	<0.10
CRYSTAL	19	6.34	13.5	5	0.50	0.36	0.25	3.8	0.47	1.3	0.26	<0.02	<0.10
ANTOINE	20	5.76	14.5	30	0.60	0.21	0.40	4.1	0.48	1.3	0.29	0.03	0.17
CROCHE	21	6.36	18.0	30	1.1	0.51	0.50	3.9	0.83	1.8	0.48	<0.02	<0.10
MATHIEU	22	5.51	15.0	20	0.65	0.14	0.44	4.6	0.55	1.3	0.30	0.04	0.15
CLARK	23	5.77	16.0	10	0.50	0.20	0.38	4.8	0.50	1.5	0.32	0.04	<0.10
CANNOX	24	6.12	16.0	50	0.60	0.42	0.69	4.4	0.55	1.4	0.34	0.05	<0.10
BOUTEILLE	25	5.42	14.5	20	0.35	0.11	0.50	4.1	0.48	1.2	0.26	0.03	0.12
JOSSEL IN	26	5.94	13.0	5	0.30	0.21	0.28	3.1	0.39	1.2	0.23	<0.02	<0.10
HUDON	27	4.92	19.5	50	0.30	-0.005	0.82	4.6	0.49	1.5	0.70	<0.02	0.35
ZERO TUBE			1.14	0	<0.20						0.00	<0.02	<0.10
ZERO TURE + CRUCHE			1.54	n	<0.20						0.01	<0.02	<0.10

NOM DU LAC		рН	Conduc- tivité µmho.cm ⁻¹	Couleur mg Chloro platinate.L ⁻¹	Couleur ABS. ā 540 mm	t.i.c. mgC.L-1	Alcalinité mgC.L-1	Ca mg L-1	Mg mg.L-1	Na mg .L-1	C1 mg .L -1	SO ₄ mg •Ľ-1	Mn mg "L-1	Al F µg.L-1	Al NF µg.L-1
DESLAURIER	1	5.51	14.0	40	0.071	1.2	0.25	1.50	0.35	0.43	0.64	4.1	0.02	110	140
LANORAIE	2	5.59	8.7	5	0.018	0.7	0.068	0.78	0.21	1.2	0.36	2.8	0.03	26	35
ABSOLON	3	5.97	11.0	5	0.009	1.6	0.42	1.35	0.33	0.33	0.47	3.1	<0.02	24	55
BEAUDRY	4	5.92	16.5	10	0.017	2.4	0.64	1.80	0.43	0.90	0.45	3.9	0.02	42	100
BOURASSA	5	5.30	11.5	5	0.019	0.4	<0.10	0.83	0.20	0.28	0.34	3.7	0.04	30	100
AUBERT	6	5.90	14.5	5	0.012	1.1	0.28	1.55	0.34	0.57	0.39	3.4	0.04	50	78
MC LISH	7	5.23	14.0	50	0.081	1.3	0.032	1.40	0.28	0.39	0.75	3.4	0.09	50	190
BROSSEAU	8	4.64	17.0	40	0.077	1.3	<0.10	0.98	0.21	0.48	0.64	4.5	0.04	345	335
ST-EDOUARD	9	4.49	18.0	30	0.065	0.7	<0.10	0.69	0.16	0.36	0.56	4.5	0.03	350	335
ST-GUILLAUM	E10	5.16	13.5	30	0.041	1.2	<0.10	1.20	0.28	0.63	0.59	4.4	0.03	145	306
SEBASTIEN	11	5.38	17.0	40	0.065	1.6	0.11	1.55	0.33	0.77	0.81	4.5	0.03	130	175
DEMERS	12	4.80	19.0	30	0.035	2.3	<0.10	1.25	0.19	0.38	0.59	4.9	0.04	200	276
CHAUVEAU	13	5.11	16.0	10	0.019	1.0	<0.10	1.40	0.22	0.37	0.45	5.6	0.03	150	234
TALA YARDE	14	5.50	19.5	30	0.034	0.9	0.15	1.90	0.33	0.54	0.81	4.2	0.02	150	211
PETIT GOUAT	15	6.18	26.0	5	0.005	2.0	0.91	2.5	0.53	0.76	0.36	4.4	0.02	30	44
GOUAT	16	5.70	16.0	5	0.045	0.5	0.10	1.55	0.28	0.48	0.45	4.6	0.02	60	120
STE-ANNE	17	4.80	15.0	20	0.072	0.8	<0.10	1.10	0.23	0.41	0.50	5.4	0.03	140	246
EBOUL I	18	5.62	12.5	5	0.003	0.7	0.065	1.20	0.28	0.38	0.36	4.4	0.02	32	62
CRYSTAL	19	5.60	17.0	40	0.007	0.7	0.041	1.45	0.26	0.50	0.42	4.8	0.04	32	61
ANTOINE	20	5.45	13.0	30	0.034	1.0	0.15	1.30	0.28	0.48	0.47	4.5	0.03	70	113
CROCHE	21	6.07	16.0	30	0.034	1.0	0.53	1.85	0.41	0.70	0.53	4.5	<0.02	70	106
MATHIEU	22	5.15	15.0	30	0.048	0.7	<0.10	1.30	0.30	0.53	0.33	5.0	0.02	110	106
CLARK	23	5.68	14.5	10	0.017	1.0	0.17	1.50	0.31	0.43	0.42	5.0	0.03	72	145
CANNOX	24	5.71	15.0	50	0.067	0.8	0.31	1.70	0.34	0.60	0.61	5.0	0.04	130	141
BOUTEILLE	25	5.25	13.5	30	0.041	<0.2	<0.10	1.20	0.26	0.60	0.47	4.5	0.02	105	147
JOSSELIN	26	5.85	12.0	15	0.007	0.7	0.12	1.35	0.23	0.47	0.28	4.2	<0.02	24	24
HUDON	27	5.08	16.0	50	0.065	1.8	<0.10	1.40	0.31	0.47	0.67	4.7	0.03	170	470

Résultats de la campagne du 24.02.81

NOM DU LAC	рН	Conducti-	Couleur	ABS. à	Alcalinité	C1-	SO 4	Na	Ca	Mg	A1 _F	A1 _{NF}
		vité µmho.cm ⁻¹	mg Chloro platinate.L ⁻¹	540 mm	mgC.L-1	mg.L-1	mg .L-1	mg.L-1	mg.L-1	mg .L-1	μg.L−1	μg.L-1
DESLAURIER ¹	5.04	13.5	5	0.064	0.004	0.64	4.2	0.44	1.15	0.29	125	336
LANORAIE 2	5.27	9.5	5	0.027	0.09	0.43	3.3	0.38	0.76	0.22	20	70
ABSOLON 3	5.28	9.0	10	0.011	0.18	0.45	3.5	0.38	1.10	0.28	32	451
BEAUDRY 4	5.70	18.0	10	0.030	1.11	0.67	5.2	0.81	2.00	0.48	97	190
MC LISH 7	4.95	15.0	15	0.078	0.001	0.74	4.3	0.48	1.20	0.30	208	255
TALAYARDE14	5.13	18.0	5	0.034	-0.02	0.97	4.2	0.60	1.50	0.32	157	305
EBOULI 18	5.86	12.0	0	0.000	0.19	0.35	4.7	0.46	1.10	0.27	10	15
ANTOINE 20	5.36	13.5	5	0.032	0.15	0.49	4.9	0.49	1.20	0.28	98	220
CLARK 23	5.47	14.5	0	0.010	0.07	0.49	5.7	0.52	1.30	0.30	82	118
CANNOX 24	5.26	17.0	30	0.083	0.21	0.73	6.6	0.59	1.60	0.36	105	152
BOUTE ILLE25	4.95	14.5	5	0.048	-0.07	0.58	5.0	0.49	1.05	0.25	132	514
MONTENDRE ²⁸	5.45	17.0	40	0.088	0.28	0.78	6.8	0.62	1.70	0.40	171	469
SANSSOUCY29	4.92	15.5	10	0.050	-0.008	0.52	4.9	0.41	1.00	0.25	168	222
TENTANT 30	5.38	11.0	30	0.052	0.29	0.73	4.1	0.51	1.05	0.27	110	236
LAVIGNE 31	5.16	13.0	20	0.068	0.08	0.81	4.2	0.49	1.15	0.29	226	254
CHAGNON 32	5.21	13.5	20	0.062	0.18	0.73	4.3	0.51	1.15	0.28	140	274
FRAZIE 33	5.42	10.0	5	0.010	0.12	0.44	3.9	0.46	1.00	0.23	70	91
PHILIPPE 34	5.62	11.5	5	0.017	0.20	0.46	4.1	0.47	1.15	0.29		104
BAKYS 35	5.29	14.0	30	0.049	0.22	0.61	4.8	0.54	1.35	0.30		578

LISTE DE REFERENCES

- ALLEN, T.F.H., S.M. BARTELL and J.F. KOONCE. 1977. Multiple stable configurations in ordination of phytoplankton community change rates. Ecology 58: 1076-1084.
- AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. 1976. Standard methods for the examination of water and wastewater. APHA, Washington.
- BOBEE, B., Y. GRIMARD, M. LACHANCE et A. TESSIER. 1981. Nature et étendue de l'acidification des lacs du Québec. INRS-Eau, rapport scientifique no 140, Environnement Québec, 225 p. (en préparation).
- BROSSET, C. 1979. Factors influencing pH in lake water. Water, Air and Soil Pollut. 10: 57-61.
- DILLON, P.J., D.S. JEFFRIES, W.A. SCHEIDER and N.D. Yan. 1980. Some aspects of acidification in southern Ontario. IN: Proc. Int. Conf. Ecological Impact Acid Precipitation, Norway, 1980. SNSF project. Edited by D. Drabløs and A. Tollan. P. 212.
- ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 1979. Methods for chemical analysis of water and wastes. EPA, Cincinnati.
- HARVEY, H.H., R.C. PIERCE, P.J. DILLON, J.R. KRAMER, D.M. WHELPDALE.
 1981. Acidification in the canadian aquatic environment: scientific criteria for assessing the effects of acidic deposition on aquatic ecosystems. NRCC no. 18475, Ottawa, 369 p.
- HESSLEIN, R.H., W.S. BROECKER, P.D. QUAY and D.W. SCHINDLER. 1980. Whole-lake radiocarbon experiment in an oligotrophic lake at the Experimental Lakes Area, northwestern Ontario. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 454-463.
- JACKSON, T.A., G. KIPPHUT, R.H. HESSLEIN and D.W. SCHINDLER. 1980. Experimental study of trace metal chemistry in soft-water lakes of different pH levels. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 387-402.
- JEFFRIES, D.S. and A.P. ZIMMERMAN. 1980. Comments on the analysis and sampling of low conductivity natural waters for alkalinity. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 901-902.
- PLATT, T. and K.L. DENMAN. 1975. Spectral analysis in ecology. Ann. Rev. Ecol. Syst. 6: 189-210.
- SCHINDLER, D.W., R. WAGEMANN, R.B. COOK, T. RUSZCZYNSKI and J. PROKOPOWICH. 1980. Experimental acidification of Lake 223, Experimental Lakes Area: background data and the first three years of acidification. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 373-377.
- STAINTON, M.P., M.J. CAPEL and F.A.J. ARMSTRONG. 1977. The chemical analysis of fresh water. 2nd ed. Fish. Mar. Serv. Misc. Spec. Publ. 25: 180 p.

STUMM, W. and J.J. MORGAN. 1970. Aquatic chemistry, Wiley-Interscience, New York.